

Encuentran en qué etapa el coronavirus puede ser más infeccioso

Por: Rusia Today
27/03/2020



Tras analizar muestras de saliva de 23 pacientes con covid-19 de entre 35 y 75 años, un grupo de investigadores de Hong Kong (China) determinó que la carga viral era más alta en los primeros siete días después de que los infectados comenzaran a mostrar síntomas de la enfermedad.

"La carga viral salival era más alta durante la primera semana después del inicio de los síntomas y posteriormente disminuyó con el tiempo. En un paciente, se detectó ARN viral 25 días después del inicio de los síntomas. La edad avanzada se correlacionó con una mayor carga viral", encontraron los científicos.

"La alta carga viral dentro de la primera semana de enfermedad sugiere que el virus se puede transmitir de una persona a otra fácilmente antes de que el paciente sea hospitalizado", comentó, citado por South China Morning Post, Kelvin To Kai-wang, del departamento de microbiología de la Universidad de Hong Kong y coautor del estudio, publicado en la revista The Lancet.

Además, los investigadores sugirieron que podría ser más seguro para la salud de los trabajadores médicos que los propios pacientes recolecten sus muestras de saliva, ya que esta práctica disminuye el riesgo de contagio.

Previamente, otro equipo de investigadores chinos determinó que el coronavirus puede mantenerse dentro del organismo infectado entre 8 y 37 días, con una media de 20.

